اسفند ۱۳۹۸
۲۳

کرونا ویروس (کووید - ۱۹)

جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
کمیته اپیدمیولوژی کووید (۱۹)

روزنگار اپیدمیولوژی ایران

مبتلایان	بهبود یافته	فوتی ها
۱۱۳۶۴	۳۵۲۹	۵۱۴





نسبت مرد به زن در موارد قطعی: ۱/۴ میانگین سنی: ۵۴ سال ؛ میانه سنی: ۵۵ سال؛ حداقل: زیر ۱ سال؛ حداکثر: ۹۸ سال





نسبت مرد به زن در افراد فوت شده: ۱/۴؛ میانگین سنی: ۶۷ سال؛ میانه سنی: ۶۴ سال؛ حداقل: ۳ سال (کودک مبتلا به سرطان خون) حداکثر: ۹۱ سال

توضیح: از آنجا که در جامعه، افراد مبتلا به دیابت و بیماری‌های قلبی و عروقی زیادتر از سایر بیماریهای زمینه‌ای است، فراوانی مرگ گزارش شده در این گروه‌ها نشان خطر بیشتر در ایشان نیست.





منبع: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کمیته تحلیل اپیدمیولوژی

اسفند ۱۳۹۸
۲۳

روزنگار اپیدمیولوژی جهان

کرونا ویروس (کووید - ۱۹)

موارد ابتلا در جهان	موارد ابتلا خارج از چین	موارد مرگ در جهان	مرگ و میر کشندگی بیماری
۱۳۲۵۶۷	۵۱۵۸۶	۴۹۴۷	۳/۷٪

فراوانی تجمعی موارد بیماری از روزی که ۱۰۰ امین مورد بیماری در کشورها گزارش شده است.



متوسط میزان رشد روزانه مبتلایان در کشورهای مختلف ۳۳٪ بوده است. مدل نمودار استخراج شده برای ایران شبیه کره جنوبی است.

نمودار چندکشور غیرعادی به نظر می رسد:

* آمریکا که احتمالا بدلیل پنهان‌کردن کرونا تا روز ششم بوده است.
* ژاپن یا بدلیل اقدامات سخت و سریع یا عدم گرفتن تست از مبتلایان و لذا گزارش کمتر بوده‌است.
* به نظر می‌رسد شهر-کشورهای کوچکی نظیر هنگ‌کنگ و سنگاپور هم که در کنترل بیماری موفق بوده‌اند بیشتر بدلیل اقدامات سخت‌گیرانه است که در کشورهای بزرگ قابل اجرا نیست؛ مثل مجازات زندان یا پرداخت ۱۰هزار دلار برای عدم قرنطینه خانگی و ... و البته تعطیلی سریع مدارس هم موثر بوده‌است.





- تعداد کشورهای گزارش کننده بیماری: ۱۲۳
- بیشترین موارد ابتلا در خارج از چین: ایتالیا (۱۵۱۱۳)، ایران (۱۱۳۶۴) و کره جنوبی (۷۹۷۷)، اسپانیا (۲۹۶۵)، فرانسه (۲۸۶۰)، آلمان (۲۳۶۹)، آمریکا (۱۲۶۴)، سوییس (۸۵۸)، ژاپن (۶۷۵)، دانمارک (۶۷۴)، سوئد (۶۲۰)، هلند (۶۱۴)، انگلستان (۵۹۴)

منبع: سازمان بهداشت جهانی